

דף הנחיות לטיפול לאחר ניתוח קטרקט

מצורף מרשם לטיפות אותן יש לזלף **בעין המנותחת** לאחר הניתוח. המרשם מכיל מספר סוגי טיפות. מטרת הטיפות הינו מניעת דלקת ומניעת זיהום בעין המנותחת.

כשעתיים לאחר הניתוח יש להתחיל לזלף טיפה אחת מהבקבוקים – ויגמוקס (VIGAMOX) ופרד פורטה (PRED FORTE), כל שעתיים. יש לנער הבקבוקים לפני השימוש. לא חשוב הסדר שבין הבקבוקים, אבל חשוב להמתין 3-4 דקות בין בקבוק לבקבוק. ביום הראשון של הניתוח וביום למחרת הניתוח יש לזלף הטיפות כל שעתיים. בלילה – אין צורך לזלף הטיפות. חשוב להצמיד מגן הפלסטיק לעין על מנת לא לגרד במהלך השינה (במשך שבוע לאחר הניתוח)

יומיים לאחר הניתוח יש לרדת עם הטיפול הטיפתי ל – 4 פעמים ביום, משני סוגי הטיפות עד לסיום כל הבקבוקים, אלא אם כן ניתנה הנחייה אחרת.

שם התרופה	מינון התרופה	פרד פורטה PRED FORTE	ויגמוקס VIGAMOX	נבנאק NEVANAC
				
ביום הניתוח ולמחרת הניתוח	כל שעתיים	כל שעתיים	כל שעתיים	3 פעמים ביום
מהיום השלישי עד סוף הטיפות	4 פעמים ביום	4 פעמים ביום	4 פעמים ביום	3 פעמים ביום
כמות	שני בקבוקים	בקבוק אחד	בקבוק אחד	בקבוק אחד

טיפות **NEVANAC** – טיפות המקטינות הסיכון לבצקת של הרשתית. טיפות אלו יש לזלף 3 פעמים ביום עד לסיום הבקבוק.

תחליפי דמעות - ניתן להוסיף טיפות של תחליפי דמעות במידה ויש תחושת צריבה, גוף זר או דמעת לאחר הניתוח.

יש לשים לב לסיים את כל הבקבוקים.

באיחולי הצלחה והחלמה מהירה מכל צוות המרפאה